

INFORMACIÓ VACUNES NO FINANÇADES (ADOLESCENTS)

Hi ha vacunes **recomanades** (per Associació Espanyola de Pediatria, Societat Catalana de Pediatria, i d'altres) que no estan incloses dins d'aquest calendari i que **no estan finançades** pel Servei Català de la Salut.

- Vacuna contra el **Meningococ B**. És un bacteri que causa infeccions poc freqüents però molt greus, com ara la meningitis i la sèpsia (infecció de la sang). Pot afectar a persones de totes les edats, però els casos són més freqüents en nens menors de 2 anys i adolescents. Hi ha 2 vacunes disponibles:
 - **Bexsero**. Es pot administrar a qualsevol edat a partir dels 2 mesos de vida. La pauta de vacunació dependrà de l'edat d'inici.
 - **Trumenba**. Es pot administrar a partir dels 10 anys d'edat. Són 2 dosis separades un mínim de 6 mesos entre elles.
- Vacuna contra els **Meningococs A-C-W-Y**. Poden causar meningitis i/o sèpsia. Es recomana la vacunació als 12 mesos i 12 anys (substituiria el reforç de la vacuna MCC), però es pot administrar a qualsevol edat. S'ha aprovat l'administració de forma finançada de la dosi dels 12 anys.

També està indicada a:

- Adolescents a partir dels 14 anys que vagin a residir en països en els que la vacuna està indicada, com EE.UU., Canadà, Regne Unit, Àustria, Grècia i Itàlia.
- Qualsevol persona (major de 6 setmanes de vida) que viatgi a països amb elevada incidència d'aquesta malaltia meningocòccica.

Hi ha 2 vacunes disponibles:

- **Nimenrix**. Es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida. Són possibles varies pautes d'administració.
 - **Menveo**. Es pot administrar a partir dels 2 anys d'edat. Dosi única.
- Vacuna contra el **Virus del Papil·loma Humà (VPH)**. És un germen molt estès que afecta més de la meitat de les persones que tenen relacions sexuals, encara que en la gran majoria d'elles no els provoca cap problema i passen la infecció sense haver-la notat. Aquesta vacuna s'administra dins el calendari de vacunes sistemàtiques a les adolescents, però la recomanació també és pels adolescents per prevenir berrugues genitals, algun tipus de càncer i la transmissió del virus.
 - **Gardasil**. Es pot administrar a partir dels 9 anys. Depenent de l'edat la pauta serà de 2 o 3 dosis.

Per a més informació:

<http://vacunasaep.org/>

<http://www.vacunas.org/>

<https://capguineuetaics.wordpress.com/>

***Als centres del Servei Català de la Salut no podem administrar cap vacuna comprada fora de l'estat espanyol.**