



INFORMACIÓ DE VACUNES NO FINANÇADES (INFANTS)

El calendari de vacunes del Departament de Salut s'inicia als 2 mesos d'edat. Hi ha vacunes **recomanades** (per Associació Espanyola de Pediatria, Societat Catalana de Pediatria, i d'altres) que no estan incloses dins d'aquest calendari i que **no estan finançades** pel Servei Català de la Salut.

- Vacuna contra el **Meningococ B**. És un bacteri que causa infeccions poc freqüents però molt greus, com ara la meningitis i la sèpsia (infecció de la sang). Pot afectar a persones de totes les edats, però els casos són més freqüents en nens menors de 2 anys i adolescents. Hi ha 2 vacunes disponibles:
 - **Bexsero**. Es pot administrar a qualsevol edat a partir dels 2 mesos de vida. La pauta de vacunació dependrà de l'edat d'inici. Es recomana la vacunació dels lactants a partir dels 3 mesos d'edat, la segona dosi després d'un mínim de 2 mesos, i una dosi de reforç a partir dels 12 mesos.
 - **Trumenba**. Es pot administrar a partir dels 10 anys d'edat. Són 2 dosis separades un mínim de 6 mesos entre elles.
- Vacuna contra el **Rotavirus**. És la principal causa d'hospitalització per diarrea en lactants en el nostre medi. S'administra per via oral. Hi ha 2 vacunes disponibles:
 - **Rotarix**. La primera dosi es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida i no més tard de les 16 setmanes. Són 2 dosis, la pauta recomanada és 2, 4 mesos.
 - **Rotateq**. La primera dosi es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida i no més tard de les 12 setmanes. Són 3 dosis, la pauta recomanada és 2, 4, 6 mesos.
- Vacuna contra els **Meningococs A-C-W-Y**. Poden causar meningitis i/o sèpsia. Es recomana la vacunació als 12 mesos i 12 anys (substituiria el reforç de la vacuna MCC), però es pot administrar a qualsevol edat. S'ha aprovat l'administració de forma finançada de la dosi dels 12 anys.

També està indicada a:

- Adolescents a partir dels 14 anys que vagin a residir en països en els que la vacuna està indicada, com EE.UU., Canadà, Regne Unit, Àustria, Grècia i Itàlia.
- Qualsevol persona (major de 6 setmanes de vida) que viatgi a països amb elevada incidència d'aquesta malaltia meningocòccica.

Hi ha 2 vacunes disponibles:

- **Nimenrix**. Es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida. Són possibles varies pautes d'administració.
- **Menveo**. Es pot administrar a partir dels 2 anys d'edat. Dosi única.

Per a més informació:

<http://vacunasaep.org/>

<http://www.vacunas.org/>

<https://capguineuetaics.wordpress.com/>

*Als centres del Servei Català de la Salut no podem administrar cap vacuna comprada fora de l'estat espanyol.